

Data da Emissão:
15/03/2018



Universidade Federal de Santa Catarina
Centro de Ciências da Educação
Núcleo de Desenvolvimento Infantil

Procedimento
Operacional
Padrão

POP
nº 12

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA NASAL

Executante: Enfermeiro e Técnico de Enfermagem

Objetivos:

- Administrar a medicação prescrita pelo profissional de saúde;
- Desobstrução, tratamento e absorção de medicamento pela mucosa nasal;
- Produzir efeitos sistêmicos após a absorção na circulação sanguínea.

Material Necessário

- Medicação acompanhada de receita;
- Gaze;
- Cotonetes;
- Soro fisiológico 0,9%;
- Seringa descartável.

Procedimento:

- Receber dos pais a medicação a ser administrada juntamente com a receita médica e a informação do horário que deverá ser administrado;
- Orientar os pais a retirarem a medicação no final do turno no Serviço de Atenção a Saúde e trazer novamente no dia seguinte, caso a criança continue utilizando;
- Higienizar as mãos previamente ao procedimento;
- Conferir o nome completo da criança, nome do medicamento, dosagem, horário e via de administração;
- Levar o medicamento, até a criança em sala de aula ou solicitar que a criança seja trazida até serviço de atenção à saúde;
- Chamar criança pelo nome completo e conferir com a professora se é a criança certa;

- Explicar o procedimento a criança;
- Instruir a criança, se necessário, a assoar o nariz suavemente se notar o excesso de secreção nasal. No caso de bebês, realizar a limpeza das fossas nasais, com auxílio de gaze, cotonetes ou seringas e soro fisiológico;
- Instilar medicação conforme indicação;
- Higienizar as mãos após o procedimento;
- Registrar em prontuário eletrônico;
- Anotar qualquer intercorrência antes, durante e após a administração do medicamento, bem como observar e registrar possíveis reações alérgicas.

Cuidados Especiais:

- Não será permitida, em nenhuma hipótese, a permanência de medicamentos dentro das mochilas das crianças em sala de aula;
- Verificar no prontuário se criança é alérgico a algum componente do medicamento;
- Os pais podem ser fontes de informação sobre a melhor abordagem e sobre as reações da criança a experiência, em especial em crianças com alguma deficiência;
- A congestão nasal interfere na alimentação, por isso devem ser instiladas as soluções 20 minutos antes das alimentações para limpar as vias nasais e diminuir a congestão.

Indicações:

- Dar continuidade aos tratamentos prescritos, iniciados em domicílio.

Elaborado por: Enf^a Dr^a Elfy Margrit Göhring Weiss e Enf^a Msc. Ana Paula Minuzzi

Data: 09/07/2015

Revisado por: Enf^a Msc. Ana Paula Minuzzi e Enf^a Msc. Camila Santos Pires Lima

Data: 15/03/2018

Revisado por: Enf^a Msc. Ana Paula Minuzzi

Data: 19/08/2019

Bibliografia:

WONG, D.L. Enfermagem pediátrica. 9^a. Edição. Editora Elsevier. Rio de Janeiro, 2014.