

Data da Emissão:  
15/03/2018



Universidade Federal de Santa Catarina  
Centro de Ciências da Educação  
Núcleo de Desenvolvimento Infantil

Procedimento  
Operacional  
Padrão

POP  
nº 08

## ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA RETAL

**Executante: Enfermeiro e Técnico de Enfermagem**

### Objetivos:

- Administrar a medicação prescrita pelo profissional de saúde;
- Aliviar a dor, reduzir a infecção, inflamação entre outros efeitos terapêuticos;
- Dificuldade de aceitação oral da medicação;
- Produzir efeitos sistêmicos após a absorção na circulação sanguínea.

### Material Necessário

- Medicação acompanhada de receita;
- Luvas de procedimento;
- Gaze ou algodão.

### Procedimento:

- Receber dos pais a medicação a ser administrada juntamente com a receita e a informação do horário que deverá ser administrado;
- Orientar os pais a retirarem a medicação no final do turno no Serviço de Atenção a Saúde e trazer novamente no dia seguinte, caso a criança continue utilizando;
- Conferir o nome completo da criança, nome do medicamento, dosagem, horário e via de administração;
- Chamar criança pelo nome completo e conferir com a professora se é a criança certa;
- Trazer a criança ou solicitar a um adulto que a traga ao Setor de Atenção a Saúde;
- Higienizar as mãos previamente ao procedimento;
- Calçar luvas de procedimento;
- Explicar a criança o procedimento que será realizado;

- Posicionar a criança em decúbito lateral;
- Introduzir a medicação de forma suave no reto, com lubrificação prévia se necessário;
- Pressionar as nádegas mantendo-as unidas com firmeza para aliviar a pressão sobre o esfíncter anal até que a urgência para expulsar o medicamento tenha cessado;
- Retirar as luvas de procedimento;
- Higienizar as mãos após o procedimento;
- Registrar em prontuário eletrônico;
- Anotar qualquer intercorrência antes, durante e após a administração do medicamento, bem como observar e registrar possíveis reações alérgicas.

**Cuidados Especiais:**

- Não será permitida, em nenhuma hipótese, a permanência de medicamentos dentro das mochilas das crianças em sala de aula;
- Verificar no prontuário se criança é alérgico a algum componente do medicamento;
- Os pais podem ser fontes de informação sobre a melhor abordagem e sobre as reações da criança a experiência, em especial em crianças com alguma deficiência.

**Indicações:**

- Dar continuidade aos tratamentos prescritos, iniciados em domicílio.

**Elaborado por:** Enf<sup>a</sup> Dr<sup>a</sup> Elfy Margrit Göhring Weiss e Enf<sup>a</sup> Msc. Ana Paula Minuzzi

**Data:** 09/07/2015

**Revisado por:** Enf<sup>a</sup> Msc. Ana Paula Minuzzi e Enf<sup>a</sup> Msc. Camila Santos Pires Lima

**Data:** 15/03/2018

**Revisado por:** Enf<sup>a</sup> Msc. Ana Paula Minuzzi

**Data:** 19/08/2019

**Bibliografia:**

WONG, D.L. Enfermagem pediátrica. 9<sup>a</sup>. Edição. Editora Elsevier. Rio de Janeiro, 2014.