

Data da Emissão:

06/06/2019



**Universidade Federal de Santa Catarina
Centro de Ciências da Educação
Núcleo de Desenvolvimento Infantil**

**Procedimento
Operacional
Padrão**

**POP
nº 29**

AVALIAÇÃO E CUIDADOS COM ESCABIOSE

Executante: Enfermeiro e Técnico de Enfermagem

Definição:

Parasitose da pele causada por um ácaro cuja penetração deixa lesões em forma de vesículas, pápulas ou pequenos sulcos, nos quais ele deposita seus ovos.

Objetivos:

- Identificar precocemente suspeita de escabiose;
- Encaminhar criança para avaliação médica e possível tratamento;
- Reduzir o risco de infecção cruzada.

Material Necessário

- Luvas de procedimento.

Procedimento:

- Preparar a criança explicando o procedimento e descobrindo a área do corpo a ser avaliada;
- Realizar exame físico;
- Avaliar morfologia e distribuição das lesões cutâneas; atentar para lesões em forma de vesículas, pápulas ou pequenos sulcos;
- Observar especialmente: regiões interdigitais, punhos (face anterior), axilas (pregas anteriores), região periumbilical, sulco interglúteo e órgãos genitais externos (nos meninos). Podem também ocorrer no couro cabeludo, nas palmas das mãos e plantas dos pés.
- Em caso de suspeita de escabiose chamar imediatamente a família;
- Solicitar à família que a criança seja submetida a atendimento médico para identificação das lesões e confirmação ou descarte da suspeita;
- Solicitar retorno da família quanto ao diagnóstico médico;
- Em caso de confirmação da parasitose, solicitar que a criança seja afastada conforme atest

médico, que deve ocorrer pelo menos até 48 horas após o início do tratamento médico prescrito.

- Solicitar ao Serviço de Higienização a desinfecção da sala em que o grupo da criança está locado;
- Solicitar a uma auxiliar de creche a desinfecção dos brinquedos e objetos a que a criança tem acesso frequentemente. A desinfecção dos objetos plásticos deve ser feita com água e sabão. Os objetos de madeira e similares devem ser higienizados com álcool. Os tecidos devem ser encaminhados à lavanderia;
- Ao retorno da criança à instituição, solicitar aos pais o atestado médico.

Cuidados Especiais:

- O prurido intenso é causado por reação alérgica a produtos metabólicos do ácaro. Caracteristicamente essa manifestação clínica se intensifica durante a noite, por ser o período de reprodução e deposição de ovos desse agente.

Indicações:

- Sempre que houver uma criança com lesões pruriginosas.

Elaborado por: Enf^a Msc. Ane Elisa Paim e Enf^a Msc. Karla Gomes Sifroni.

Data: 06/06/2019

Revisado por:

Data:

Bibliografia:

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Doenças infecciosas e parasitárias : guia de bolso / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 8. ed. rev. – Brasília : Ministério da Saúde, 2010.