COVID-19: VACINAS

QUAIS VACINAS ESTÃO DISPONÍVEIS NO BRASIL?

Coronavac

Laboratório responsável: Instituto Butantan/Sinovac

Doses: 2 doses, intervalo de 3 semanas entre as doses.

Covishield

Laboratório responsável: AstraZeneca/Oxford/Fiocruz

Doses: 2 doses, intervalo de 12 semanas entre as doses.

Comirnaty

Laboratório responsável: Pfizer/BioNTech

Doses: 2 doses, intervalo de 12 semanas entre as doses.



Perguntas frequentes:

Vacinados ainda podem pegar Covid-19?

Sim. Estudos demonstram que a vacina reduz a incidência da doença, internações, casos graves e óbitos, mas ainda é possível a ocorrência de casos leves ou moderados e, mais raramente, o agravamento da doença e óbito.

Vacinados podem transmitir Covid-19?

Os estudos ainda não conseguiram avaliar se pessoas vacinadas deixam de transmitir a Covid-19 quando infectadas. Orienta-se que, mesmo após a vacinação, é importante manter as medidas de prevenção, como uso de máscara, higienização frequente das mãos e evitar aglomerações.

A vacina diminui a necessidade de uso de máscara?

Até que grande parte da população esteja vacinada, ainda é preciso manter as regras de distanciamento físico, higienização das mãos e o uso de máscara.

Quando será possível reduzir as medidas de isolamento?

É esperado que, para que se possa controlar a doença, grande parte da população deva estar vacinada. Segundo a OMS, isso deve acontecer quando cerca de 70% da população for imunizada.

A resposta imune à vacina é imediata?

Não. Espera-se que demore cerca de 4 semanas após o término do esquema vacinal (todas as doses) para adquirir a imunidade.

Referências