


PROTOCOLO DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM DO NDI PARA CONDUÇÃO DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19 - CRIANÇAS

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO

A criança apresenta pelo menos dois (2) dos seguintes sintomas: febre aferida ou informada ($T^{\circ} \geq 37,8^{\circ}\text{C}$), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, obstrução nasal, sintomas gastrointestinais?



Os casos suspeitos (sintomáticos) de Síndrome Gripal devem ser orientados a entrar em isolamento por pelo menos 10 dias, contados a partir da data de início dos sintomas, podendo ser suspenso após esse período, desde que esteja há pelo menos 24 horas sem apresentar febre e com melhora dos sintomas respiratórios OU que apresente resultado não detectável (negativo) no teste RT-qPCR (swab nasal ou saliva) e que também esteja há pelo menos 24 horas sem apresentar febre e com melhora dos sintomas respiratórios.

O resultado reagente (positivo) do teste TR-AG em casos suspeitos (sintomáticos) de Síndrome Gripal deve ser considerado como caso confirmado para COVID-19, devendo ser mantido o isolamento por pelo menos 10 dias contados a partir da data de início dos sintomas, podendo ser suspenso após esse período, desde que esteja há pelo menos 24 horas sem apresentar febre e com melhora dos sintomas respiratórios.

O resultado não reagente (negativo) do teste TR-AG em casos suspeitos (sintomáticos) de Síndrome Gripal não descarta o caso. Neste caso, deve ser coletada outra amostra para realização de teste RT-qPCR (swab nasal ou saliva). O isolamento deve ser mantido por pelo menos 10 dias contados a partir da data de início dos sintomas, podendo ser suspenso após esse período ou após um resultado não detectável (negativo) do RT-qPCR, desde que esteja há pelo menos 24 horas sem apresentar febre e com melhora dos sintomas respiratórios.

Todos os contatos próximos* de casos suspeitos (sintomáticos) devem ser orientados a permanecer em quarentena por 14 dias, contados a partir da data do último contato com o caso, sendo monitorados quanto ao aparecimento de sinais e sintomas gripais e testados no período oportuno.

*Contato próximo: todas as pessoas que tiveram contato direto com o caso suspeito ou confirmado, entre dois dias antes até o décimo dia após o início dos sintomas, por um período mínimo de 15 minutos sem utilizar as barreiras de proteção (máscara cirúrgica, PFF2 ou similar), sem realizar distanciamento físico de 1,0 a 1,5 m, ou que teve contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos), ou que compartilharam materiais de uso comum (por exemplo: materiais escolares), ou que fizeram lanches ou refeições próximos, ou que compartilharam assento próximo no transporte (escolar transporte por aplicativo, ônibus).